

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41.42

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-57

1er JUIN 1982

VIGNE

ÉDITION DU LIMOUXIN N° 4

rédigé en collaboration avec la CAVALE

TRAITEZ

- OIDIUM

LES CONDITIONS CLIMATIQUES SONT TRES FAVORABLES A SON DEVELOPPEMENT.

Renouvelez obligatoirement la protection à l'aide d'une des spécialités suivantes :

- Bayleton 5 (1 kg de produit commercial à l'hectare)
- Rubigan 4 (0,3 litre de produit commercial à l'hectare)
- Soufre mouillable (Thiovit ou Microthiol : 12,5 kg de produit commercial à l'hectare)

Pour la vigne arrivant en floraison, prévoir un poudrage à raison de 40 kg à l'hectare.

- LES TORDEUSES

Les prises ont été importantes en Cochylis et Eudémis, mais les pontes sont variables en fonction des tenements et de la précocité des cépages. Les premières éclosions ont eu lieu :

à CEPIE : Eudémis sur Aramon dans la plaine et sur les coteaux.

à POMAS : présence faible d'Eudémis.

à VILLELONGUE et LOUPIA : sur Aramon et Chardonnay, Eudémis fréquents.

en HAUTE VALLEE, ESPERAZA - CONILHAC : prises importantes de Cochylis, pas de chenilles pour l'instant.

Si vous avez opté pour des "traitements préventifs" intervenez dès réception à l'aide de :

Ultracide 20	2 litres de produit commercial à l'hectare			
Decis	0,35	"	"	"
Pennicap	1,5	"	"	"
Fulkill	1,5	"	"	"

NB : Pour le Decis la dose indiquée est efficace pour la lutte contre la 1ère génération.

Si vous préférez les traitements curatifs observez vos parcelles les plus précoces et ne traitez que si vous voyez 1 à 2 vers par grappe avec

Lannate	2 litres/hectare
Verfor	2 litres/hectare
Rhodiatox acaricide	2,5 litres/hectare
Neutrion	2,5 litres/hectare
Ekator	4 kilos/hectare

Pour la Haute-Vallée, retardez de 2 à 3 jours, en tenant compte du stade végétatif.

- MILDIOU

A CE JOUR AUCUNE TACHE DE MILDIOU N'A ETE DECOUVERTE LES CONDITIONS CLIMATIQUES NE SONT PAS FAVORABLES AU DEVELOPPEMENT DE LA MALADIE.

Pour les vignes devant fleurir prochainement prévoir d'effectuer une protection contre le mildiou. Le traitement peut se faire vers la fin de la semaine, en même temps que celui dirigé contre les vers.

Employez de préférence un produit systémique ou pénétrant permettant de protéger toute la durée de la floraison.

Tirage du 1er Juin 1982 - 400 exemplaires

© Bulletin Technique des Avertissements Agricoles - Montpellier 1982;